

# Algoritmo Tamizaje De Cáncer De Mama. Estándar de práctica clínica

Para uso en países y empresas Keralty

## Tamizaje para cáncer de mama en mujeres asintomáticas mayores de 18 años

### Mujeres asintomáticas de bajo riesgo

Menores de 40 años

Promover el autoconocimiento de las mamas mediante autoexamen

40 a 45 años

-Examen clínico de la mama anual  
-Individualizar la realización de mamografía

45 y 75 años

Mamografía por tomosíntesis (según disponibilidad) cada dos años dentro de un programa de tamizaje organizado

La mujer debe informar oportunamente si se detectan:

- Signos de alarma: Masas o nódulos, aumento de tamaño de alguna de las mamas, cambios en la piel de la mama (áreas de hundimiento o retracción, áreas de enrojecimiento, áreas de ulceración), anomalías en el pezón y/o en la areola (secreción por alguno de los pezones, inversión o hundimiento del pezón, lesiones en la piel o áreas de retracción), masas o ganglios en las regiones axilares.

### Mujeres asintomáticas de alto riesgo

Examen clínico de la mama cada 6 a 12 meses

Remisión a cirugía de mama

Instituto Nacional de Cancerología (INC). Manual para la Detección Temprana del Cáncer de Mama Manual para la Detección Temprana Detección Temprana del Cáncer de Mama del Cáncer de Mama [Internet]. Bogotá D.C; 2025.

-Mamografía con tomosíntesis (de acuerdo a disponibilidad)  
-Ecografía complementaria  
-Estudio funcional

HDA/neoplasia lobular: seguimiento especializado desde el diagnóstico, examen clínico cada 6-12 meses, mamografía con tomosíntesis y ecografía anual, resonancia cada 2 años.


### Mujeres en embarazo o lactancia

Solo estudios diagnósticos si hay hallazgos clínicos anormales:

- En embarazo, ECM + ecografía (RM sin contraste 2° trimestre, mamografía con protección si necesario)
- En lactancia, RM con contraste + ecografía y mamografía si sospecha

### RECORDAR:

- Enseñar a las mujeres el autoexamen de las mamas como estrategia de concientización y autoconocimiento
- El Examen clínico de la mama anual en mujeres mayores de 40 años
- Mamografía con tomosíntesis (cuando esté disponible) cada 2 años, para mujeres asintomáticas de bajo riesgo entre 45 y 75 años
- En mujeres con signos mamarios en el examen físico deben contar con acceso a las pruebas diagnósticas requeridas de manera prioritaria"



Instituto Nacional de Cancerología (INC). Manual para la Detección Temprana del Cáncer de Mama Manual para la Detección Temprana del Cáncer de Mama del Cáncer de Mama [Internet]. Bogotá D.C. 2025.

## Algoritmo Tamizaje De Cáncer De Mama. Estándar de práctica clínica

Para uso en países y empresas Keralty